




Avviso flash Mirtillo N.5

17 giugno 2021

Situazione meteo: MOMENTI SOLEGGIATI E CALDI, MA CON OCCASIONI TEMPORALESCHIE II promontorio di alta pressione che interessa il Nord-Ovest si sposta verso est favorendo la risalita di aria ancora calda dal Mediterraneo, ma via via più umida e instabile grazie all'apporto di correnti meridionali in quota. Questo determinerà nei prossimi giorni tempo nel complesso estivo sotto il profilo termico e con impulsi temporaleschi che interesseranno non solo il settore alpino, ma anche le pianure a tratti. Un'attenuazione nell'instabilità è attesa sabato. (fonte NIMBUS)

Moscerino dei piccoli frutti (*Drosophila suzukii*): nel grafico e nella tabella sono riportate le catture delle letture delle trappole di ieri mercoledì 16 giugno. Nelle trappole sono conteggiati anche un numero elevato di drosophilidi da 200 a 400 individui.



Trappola	Drosophila suzukii		
	Totale	Femmine	Maschi
Agrion mirtillo (Boves)	0	0	0
Agrion incolto (Boves)	1	0	1
Peveragno lampone	1	1	0
Revello mirtillo	19	6	13
ciliegio Boves	20	11	9
Revello Via dei boschiMirtillo	8	5	3
Revello Via Trav Barge Mirtillo	0	0	0

Non sono necessari interventi chimici generalizzati.

Si consiglia di intervenire con il primo trattamento dopo il primo stacco, in particolare nei mirtilleti dove lo scorso anno sono stati riscontrati i danni.

E' consigliabile intervenire dopo il tramonto, in modo da avere una maggior copertura sul volo serale e dell'alba

Prodotto	Sostanza attiva	Carenza gg	Dose		Numero massimo di trattamenti
			gr-cc/hl	Kg-L/ha	
Spada 50 WG	Fosmet	5	150	1,5	1
Exalt 25 SC	Spinetoram	3		2,4	2 (massimo tre tra le spinosine)
Asset Five, Rabona	Piretrine	2	64	0,51	3
Agro-pyr, Asset Duo, Biopiren Plus, Biovis, Flora Verde, Pireco, Piretro Actigreen, Piretro verde, Several	Piretrine	2	160	1,28	3

Marciume dei frutti: condizioni climatiche favorevoli.

SI CONSIGLIA DI EVITARE CONCIMAZIONI AZOTATE

Sono segnalate in alcuni appezzamenti presenza di marciumi sui grappoli in particolare là dove non si sono staccate le corolle.

Negli appezzamenti prossimi alla raccolta e in previsioni di piogge **è consigliato ripetere il trattamento** con Bacillus e per chi non lo ha ancora fatto, effettuare il secondo Signum, per chi è più vicino alla raccolta dei mirtilli.

Prodotto	Sostanza attiva	Carenza gg	Dose		Numero massimo di trattamenti
			gr-cc/hl	Kg-L/ha	
Signum	Boscalid + Pyraclostrobin	3	150	1,5	2
Amylo-X	Bacillus amyloliquefaciens ceppo D747	0	200	2,5	6
Serifel	Bacillus amyloliquefaciens ceppo MBI600	0	50	0,5	6
Serenade ASO	Bacillus subtilis ceppo QST 713	0	400-800	4-8	6
3LOGY	Eugenolo, Geraniolo, Timolo autorizzato dal 11.02.2021 al 10.06.2021	1	400	4	5

Afidi, Formiche e Forficule: segnalata la presenza in più appezzamenti. I trattamenti per il controllo della drosophila sono efficaci anche per il controllo delle formiche, delle forficule e delle cocciniglie

SI RICORDA DI NON ANTICIPARE LE RACCOLTE AL FINE DI SALVAGUARDARE LA QUALITA' E SERBEVOLEZZA DEI FRUTTI, COSI' DA GARANTIRSI ANCHE FRUTTI DI PEZZATURA PIU' GRANDE E CON UN MAGGIOR PESO SPECIFICO

IMPORTANTE l'organizzazione aziendale per la raccolta con numero sufficiente di raccoglitori, in modo da non avere ritardo nelle raccolte.

Prossimo aggiornamento previsto per venerdì 26 giugno