



Avviso flash Castagno n. 01/2021

08 luglio 2021

Anche quest'anno prosegue l'attività di monitoraggio del volo della Tortrice intermedia (*Cydia flagiglandana*) e della Tortrice tardiva (*Cydia splendana*) del Castagno in 7 siti (Bernezzo, Cervasca, Chiusa Pesio, Dronero, Peveragno, Piasco, Revello).

Le trappole sono state posizionate a partire da inizio luglio. In tabella le letture effettuate in questi giorni:

Località	Feromone	letture del 04 e 8 lug	
		Fagiglandana	Splendana
Bernezzo RM	Sumitomo	2	
Bernezzo RM	Sumitomo		17
Chiusa Pesio AT	Sumitomo		3
Chiusa Pesio AT	Isagro		0
Revello DP	Isagro		1
Revello DP	Sumitomo		0
Santa Croce di Cervasca RG	Sumitomo		0
Santa Croce di Cervasca RG	Sumitomo	1	
Santa Croce di Cervasca RG	Isagro		5

Tortrice tardiva del castagno (*Cydia splendana*)

- L'inizio del volo dei maschi dovrebbe essere iniziato in tutti gli areali e raggiungere il picco fra tre settimane.
- La deposizione delle uova avviene 4-5 giorni dopo l'accoppiamento delle femmine.
- La schiusura delle uova inizia 10-12 giorni dopo l'accoppiamento.

Sostanza attiva	Formulato commerciale	Carenza gg	Autorizzato su:			Limitazioni da etichetta e consigli applicativi
			Pammene fasciana	Cydia flagiglandana	Cydia splendana	
BACILLUS THURINGENSIS (subspecie <i>kurstaki</i> , ceppo PB-54)	BAC MK, BACILLUS CHEMIA, BELTHIRUL, BIOLARV, LEPIBACK, TURIBEL	3		X	X	Effettuare max. 2 applicazioni per stagione, con un intervallo tra i trattamenti di 7-14 giorni
BACILLUS THURINGENSIS (subspecie <i>kurstaki</i> , ceppo SA12)	COSTAR WG	Non richiesta		X	X	A partire dalla fine della fioritura intervenire ad intervalli di 7 giorni fino ad un massimo di 6 applicazioni consecutive
BACILLUS THURINGENSIS (subspecie <i>kurstaki</i> , ceppo sierotipo 3a,3b - SA11)	DELFIN	Non richiesta		X	X	Dopo l'emergenza dell'infiorescenza intervenire alla comparsa delle prime larve e ripetete i trattamenti ad intervalli di 7 giorni se necessario fino ad un massimo di 6 applicazioni consecutive
SPINOSAD	CONSERVE SC, LASER, SUCCESS, TRACER 120	7 in pieno campo		X	X	Sono consentiti al massimo 3 trattamenti e comunque non più di 2 consecutivi
Clorantraniliprole	CORAGEN, VESTICOR	21		X		Massimo 2 applicazioni per anno. Intervenire durante l'ovodeposizione, prima della schiusura delle prime uova.
Emamectina benzoato	AFFIRM OPTI	7	X	X	X	Effettuare massimo 3 trattamenti per anno. Iniziare i trattamenti alle prime schiuse delle uova o al picco del volo utilizzando le trappole di monitoraggio.
Deltametrina	ANTAL, CIDIAL, DECIS EVO, DELTAGRI, DELTAKILL EC, DEMETRINA 25 EC, DERBY, FIGHTER, GLORIAL 25 EC, WINTECH	30		X		Intervenire alla comparsa del parassita. Effettuare al massimo 3 applicazioni a distanza di 14 gg
Lambda cialotrina	KARATE ZEON, KARATE ZEON 1.5, KENDO W.Z. T.	7		X		Numero massimo di trattamenti per anno 1

In verde i prodotti autorizzati in agricoltura biologica

In giallo le sostanze attive non ammesse nelle Norme Tecniche di Produzione Integrata