




Avviso flash Mirtillo N.8

08 luglio 2021

Situazione meteo: asciutto e molto ventilato con notti fresche. Temperatura media di inizio luglio nella media storica. Grandine e nubifragi nel biellese.

Moscerino dei piccoli frutti (*Drosophila suzukii*): nel grafico e nella tabella sono riportate le catture delle letture delle trappole di ieri mercoledì 07 luglio con un aumento delle catture. I drosophilidi conteggiati da 6 a 206 sono in linea con quelli della settimana precedente fatta eccezione per la “Trappola Revello” che sono triplicati 1236 e le drosophile suzukii sono superiori a 100 individui catturati (45 femmine, 61 maschi).

Sono segnalati frutti con larve di drosophila su mirtillo e lampone, non trattato e in zone pedemontane.



Trappola	Drosophila suzuki			Altri Drosophilidi
	Totale	Femmine	Maschi	
Agrion mirtillo (Boves)	0	0	0	6
Agrion incolto (Boves)	24	10	14	147
Peveragno lampone	48	33	15	206
Revello mirtillo	106	45	61	1236
Ciliegio Boves	16	7	9	160
Revello Via dei boschi Mirtillo	4	0	4	38
Revello Via Trav Barge Mirtillo	0	0	0	11
Melle	4	3	1	39

Trattamenti: Non sono necessari interventi chimici generalizzati.

Si consiglia di intervenire dopo la raccolta solo nei mirtilleti dove è constatata una presenza di drosophila e/o lo scorso anno sono stati riscontrati danni.

E' consigliabile intervenire dopo il tramonto, in modo da avere una maggior copertura sul volo serale e dell'alba

Prodotti autorizzati per il controllo della Drosophila

Prodotto	Sostanza attiva	Carenza gg	Dose		Numero massimo di trattamenti
			gr-cc/hl	Kg-L/ha	
Spada 50 WG	Fosmet	5	150	1,5	1
Exalt 25 SC	Spinetoram	3		2,4	2 (massimo tre tra le spinosine)
Asset Five, Rabona	Piretrine	2	64	0,51	3
Agro-pyr, Asset Duo, Biopiren Plus, Biovis, Flora Verde, Pireco, Piretro Actigreen, Piretro verde, Several	Piretrine	2	160	1,28	3

Marciume dei frutti: condizioni climatiche non favorevoli.
SI CONSIGLIA DI EVITARE CONCIMAZIONI AZOTATE

Afidi, Formiche e Forficule: segnalata la presenza in più appezzamenti. I trattamenti per il controllo della drosophila sono efficaci anche per il controllo delle formiche, delle forficule e delle cocciniglie

Sono altresì segnalati danni da uccelli (Gazze, Ghiandaie, Storni, ecc)

SI RICORDA DI NON ANTICIPARE LE RACCOLTE AL FINE DI SALVAGUARDARE LA QUALITA' E SERBEVOLEZZA DEI FRUTTI, COSI' DA GARANTIRSI ANCHE FRUTTI DI PEZZATURA PIU' GRANDE E CON UN MAGGIOR PESO SPECIFICO

IMPORTANTE l'organizzazione aziendale per la raccolta con numero sufficiente di raccoglitori, in modo da non avere ritardo nelle raccolte.

Prossimo aggiornamento previsto per giovedì 15 luglio