


Info Flash n°3

Del 16/07/21

NOCCIOLO



Coordinamento corilicolo Piemontese

Aggiornamento

Campionamento cimici: secondo trattamento per l'astigiano

Tutela dei pronubi

CAMPIONAMNETO CIMICI: SECONDO TRATTAMENTO PER L'ASTIGIANO

Dopo i forti temporali di inizio settimana in questi giorni sono proseguiti i monitoraggi con la tecnica del frappe nelle diverse zone dell'astigiano.

I frappe eseguiti nei corileti evidenziano un **generalizzato aumento di cimici sul territorio astigiano**. Vista la fase di particolare sensibilità del seme in accrescimento, si consiglia, per le aziende che hanno già provveduto al primo trattamento ad inizio luglio, di **effettuare il secondo intervento insetticida** contro *Halyomorpha halys* e cimici autoctone. Tale trattamento deve essere concordato con il tecnico di zona per decidere la strategia di difesa da seguire.

Si ricorda di leggere attentamente le etichette e mantenere il dosaggio a ettaro dei singoli prodotti e bagnare con adeguato volume la chioma (almeno 10 hl/ha).

I principi attivi autorizzati contro le cimici sono:

| AVVERSITA' | PRINCIPIO ATTIVO | FORMULATO COMMERCIALE | DOSE g-mL/hL | DOSE kg-L/ha | CARENZA gg | LIMITAZIONI D'USO E CONSIGLI APPLICATIVI |
|-----------------------------------|---------------------|------------------------|--------------|--------------|----------------------------------|---|
| CIMICI (pentatomidi e coreidi) | LAMBDA - CIALOTRINA | KARATE ZEON 1.5 ecc | 170 | 1,7 | 7 | Con i PIRETROIDI al massimo 3 interventi all'anno. ETOFENPROX e LAMBDA-CIALOTRINA al massimo 1 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità. ETOFENPROX non rientra nel computo del conteggio di utilizzo di piretroidi |
| | ETOFENPROX | TREBON UP, SWORD UP | 50 | 0,5 - 0,75 | 14 | |
| CIMICE ASIATICA | ETOFENPROX | TREBON UP, SWORD UP | 50 | 0,5 - 0,75 | 14 | |
| | LAMBDA - CIALOTRINA | KARATE ZEON 1.5 ecc | 170 | 1,7 | 7 | |
| | ACETAMIPRID* | EPIK SL | 100 - 150 | 1,5 | 14 | Al massimo 1 intervento all'anno. La società consiglia di impiegarlo in presenza di forme giovanili |
| KESTREL | | - | 0,35 - 0,5 | 7 | Al massimo 2 interventi all'anno | |

* Deroga territoriale (n. 7.60.100, 1/2021A) alle norme tecniche di produzione integrata per l'operazione 10.1.1 del PSR 2014-2020 per l'utilizzo dei formulati Epik SL e Kestrel contenenti la sostanza attiva acetamiprid contro la cimice asiatica *Halyomorpha halys* su nocciolo, come da indicazioni in etichetta

TUTELA DEI PRONUBI

Si ricorda che gli interventi di difesa fitosanitaria non sono consentiti durante la fioritura delle colture, salvo espressa autorizzazione da parte del Settore Fitosanitario Regionale.

Pertanto, va considerato con estrema attenzione il fatto che, come nel caso di impiego di insetticidi, anche in caso di trattamenti con diserbanti e/o fungicidi NON SI PUO' OPERARE in presenza di fiori e di melate.

Alcune indicazioni utili a protezione dei pronubi prima di procedere con la distribuzione del prodotto fitosanitario:

- **sfalciare, lasciare appassire e rimuovere la massa vegetale per evitare che le api siano attratte da fioriture di erbe spontanee;**
- **effettuare trattamenti evitando le ore centrali del giorno in cui le api sono in attività e operando in assenza di vento per contrastare i fenomeni di deriva al momento della distribuzione;**
- **impiegare, se possibile, sostanze attive meno tossiche per combattere l'avversità.**